


El VIH/SIDA entre Hombres Hispanos/Latinos que tienen Sexo con otros Hombres (HSH)

TO DEFEAT HIV
YOU'RE A SUPERHERO.
USE YOUR SUPERPOWERS.

ENTRE HOMBRES HISPANOS/ LATINOS DIAGNOSTICADOS CON VIH EN EL 2014



85% de los casos fueron transmisiones de HSH

HSH SE REFIERE A TODOS LOS HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

sin importar la identidad sexual



- gay
- bisexual
- straight


LOS JÓVENES HISPANOS/ LATINOS HSH DUDAN DE TOMAR PREP*

debido a la falta de acceso económico a servicios de salud



*PrEP es una pastilla para prevenir el VIH que se toma una vez al día

EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE REGIONES EN LOS EE.UU. EN CUANTO A LAS INFECCIONES ENTRE HSH




los números son más altos en el Sur y más bajos en el Medio Oeste

1- sur
2- oeste
3- noroeste
4- medio oeste

EN EL 2015 LOS HISPANOS/ LATINOS REPRESENTARON

1 DE CADA 4




de los **7,159** diagnósticos de VIH entre los HSH de **13-24** años

ENTRE LOS HSH EN LOS EE.UU. DIAGNOSTICADOS CON VIH EN EL 2015

27%

fueron Hispanos/ Latinos



EL NUMERO DE HISPANOS/LATINOS HSH VIVIENDO CON VIH ES

125,375

a finales del 2014 en los EE.UU.

1/3 DE LOS LATINOS INMIGRANTES HSH NUNCA SE HAN HECHO LA PRUEBA DEL VIH Y ES MÁS PROBABLE QUE

- tengan sexo con hombres y mujeres
- sepan menos de los riesgos del VIH
- perciban su comportamiento sexual como menos riesgoso



1,080 MUERTES

Hispanos/Latinos HSH con VIH en los EE.UU en el 2014

EL VIH/SIDA ENTRE HOMBRES HISPANOS/LATINOS QUE TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES (HSH)



HSH, u hombres que tienen sexo con hombres, se refiere a todos los hombres que tienen sexo con otros hombres, sin importar como se auto-identifican (gay, bisexual, o heterosexual). Los HSH han experimentado altos índices de infección por VIH desde el principio de la epidemia. El incremento de la tasa de infección entre HSH Hispanos/Latinos indica que son necesarios más apoyo y más esfuerzos de prevención culturalmente relevantes. Además, se necesita más investigación para entender las causas de estos índices tan altos, especialmente entre HSH jóvenes (aquellos menores de 29 años.)

DATOS

- En 2015, un estimado de 8,563 hombres adultos y adolescentes Hispanos/Latinos fueron diagnosticados con VIH en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes, incluyendo a Puerto Rico.
 - » Esta cifra representa el 88% de las infecciones entre adultos y adolescentes Hispanos/Latinos diagnosticados en el 2015.¹
- Entre todos los hombres Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH durante 2015, el contacto sexual entre HSH fue la categoría más frecuente de transmisión, representando el 74% (7,271) o aproximadamente 7.4 de cada 10 infecciones entre los hombres Hispanos/Latinos.
 - » La transmisión entre HSH que además tienen el factor de Uso de Drogas Intravenosas (UDI) representaron un 3% adicional (276 casos).
- Entre los HSH en los Estados Unidos diagnosticados con VIH en el 2015, alrededor de uno de cada cuatro (27%, n=7271) son Hispanos/Latinos.¹
- Existen diferencias regionales en los Estados Unidos en relación a la infección por VIH en los HSH.
 - » El número de casos de VIH diagnosticados entre HSH Hispanos/Latinos es más alta en el sur (41%, n=3123), seguido por el oeste (32%, n=2409), el noreste (17%, n=1265), el oeste medio (6%, n=481) y las áreas dependientes de los Estados Unidos (4%, n=271).¹
- Durante el año 2015, en los Estados Unidos, la tasa de infecciones por VIH entre hombres Hispanos/Latinos fue 37.4/100,000 representando más del triple de la tasa entre los hombres blancos no-hispanos que fue 10.8/100,000. Dentro de este grupo los más afectados fueron los HSH.¹
- Los Hispanos/Latinos representaron 24% o alrededor de 1 de cada 4 de los 7159 casos de infecciones por HIV en HSH de edades entre 13-24 en 2015.¹
- Hacia finales del 2014, 114,064 HSH Hispanos/Latinos fueron identificados viviendo con VIH en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes que incluyen a Puerto Rico.¹
- Cerca del 22% ó 1 de cada 5 de los 513,045 HSH que fueron identificados viviendo con VIH a finales del 2014 fueron HSH Hispanos/Latinos.
- Hubo 1,080 muertes de HSH Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH en el 2014.¹
- La probabilidad de que los jóvenes HSH Latinos no usen PrEP fue más alta que en los jóvenes HSH blancos, esto fue debido a la preocupación causada por los posibles efectos secundarios. Las diferencias se dan en relación al nivel educativo, a los ingresos económicos, a la falta de residencia fija, y a la falta de acceso a servicios de salud a bajo costo. Estas vulnerabilidades sociales pudieran afectar negativamente la disposición y actitud de los jóvenes HSH hacia el uso de PrEP.²
- Más de un tercio de los hombres nunca se han hecho la prueba del VIH. Es más probable que aquellos que no se hacen la prueba sean hombres que tienen sexo con hombres y mujeres, que tengan menos conocimiento acerca de los riesgos del VIH y que perciban su sexualidad como de poco riesgo.³

1. Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from <https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf>

2. Bauermeister, J.A., Meanly, S., Pingel, E., Soler, J. & Harper, G. (2015). PrEP awareness and perceived barriers among single young men who have sex with men in the United States. Current HIV Research. U.S. National Library of Medicine. Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4152728>

3. Solorio, R., Forehand, M. & Simoni, J. (2013). Attitudes towards and beliefs about HIV testing among Latino immigrant MSM: a comparison of testers and nontesters. AIDS Research and Treatment, Vol 2013(2013), Article ID 563537. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.1155/2013/563537>