


EL VIH/SIDA ENTRE HOMBRES HISPANOS/LATINOS QUE TIENE SEXO CON OTROS HOMBRES (HSH)


WE'LL DEFEAT AIDS
CON GANAS

ENTRE HOMBRES HISPANOS/LATINOS DIAGNOSTICADOS CON VIH EN EL 2014



84% de los casos fueron transmisiones de HSH

HSH SE REFIERE A TODOS LOS HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES



sin importar la identidad sexual

- gay
- bisexual
- heterosexual

JÓVENES HISPANOS/LATINOS HSH DUDAN DE TOMAR PrEP*

debido a la falta de acceso económico a servicios de salud




*PrEP es una pastilla para prevenir el VIH que se toma una vez al día

EL NUMERO DE HISPANOS/LATINOS HSH VIVIENDO CON VIH

108,786

a finales del 2013 en los EE.UU.

EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE REGIONES EN LOS EE.UU. EN CUANTO A LAS INFECCIONES ENTRE HSH



los números son más altos en el Sur y más bajos en el Medio Oeste

1- sur 3- noroeste
2- oeste 4- medio oeste

EN EL 2014 HISPANOS/LATINOS REPRESENTARON

1 DE CADA 4




de los **8,018** diagnósticos de VIH entre los HSH de 13-24 años.

ENTRE LOS HSH EN LOS EE.UU. DIAGNOSTICADOS CON VIH EN EL 2014

27%

fueron Hispanos/Latinos



1/3 DE LOS LATINOS INMIGRANTES HSH NUNCA SE HAN HECHO LA PRUEBA DEL VIH Y ES MÁS PROBABLE QUE:



- tengan sexo con hombres y mujeres
- sepan menos de los riesgos del VIH
- perciban su comportamiento sexual como menos riesgoso



HISPANOS/LATINOS HSH CON VIH en los EE.UU en el 2013

1,097
MUERTES

EL VIH/SIDA ENTRE HOMBRES HISPANOS/LATINOS QUE TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES (HSH)



HSH, u hombres que tienen sexo con otros hombres, se refiere a todos los hombres que tienen sexo con otros hombres, sin importar como se auto-identifican (gay, bisexual, o heterosexual). Los HSH han experimentado altos índices de infección por VIH desde el principio de la epidemia. El incremento de casos entre HSH Hispanos/Latinos indica que más apoyo y esfuerzos culturalmente relevantes de prevención son necesarios. Además, se necesita más investigación para entender las causas de estos índices tan altos, especialmente en HSH jóvenes (aquellos menores de 29 años.)

DATOS¹

- En el 2014, un estimado de 9,379 hombres adultos y adolescentes Hispanos/Latinos fueron diagnosticados con VIH en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes, incluyendo a Puerto Rico.
 - Esta cifra representa el 86% de infecciones entre adultos y adolescentes Hispanos/Latinos diagnosticados en el 2014.
- Entre todos los hombres Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH durante el 2014, HSH fue la categoría más frecuente de transmisión, representando el 84% (7,893) o aproximadamente 8 de cada 10 infecciones entre los hombres Hispanos/Latinos.
 - La transmisión a través de contacto entre HSH y a través de Uso de Drogas Intravenosas (UDI) representaron 257 casos adicionales o 3%, contribuyendo a un incremento que llega al 87% de las infecciones por VIH atribuidas a sexo entre hombres entre los hombres Hispanos/Latinos.
- Entre los HSH en los Estados Unidos diagnosticados con VIH en el 2014, alrededor de uno de cada cuatro (26.5%) son Hispanos/Latinos.²
- Existen diferencias regionales en los Estados Unidos en relación a la infección por VIH entre HSH.
 - El número de casos de VIH diagnosticados entre HSH Hispanos/Latinos es más alta en el sur, seguido por el oeste, el noreste, el oeste medio y las áreas dependientes de los Estados Unidos.³
- El rango de infecciones por VIH en el 2014 entre hombres Hispanos/Latinos en los Estados Unidos (41.5) es tres veces más alto que entre hombres blancos no-hispanos (12.6), con los HSH cargando el peso mas grande.
- Los Hispanos/Latinos representaron 24% o alrededor de 1 de cada 5 de los 8,018 casos de infecciones por HIV en HSH de edades entre 13-24 en 2014.
- Hacia finales del 2013, 108,786 HSH Hispanos/Latinos fueron identificados viviendo con VIH en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes que incluyen a Puerto Rico.⁴
 - Cerca del 22% o 1 de cada 5 de los 497,957 HSH que fueron identificados como viviendo con VIH a finales del 2014 fueron HSH Hispanos/Latinos.
- Hubo 1,097 muertes de HSH Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH en el 2013.

1. Note: Unless otherwise noted, all statistics represent data from the CDC's HIV Surveillance Report of the United States and its six dependent areas from the year 2013, the year in which the most recent data is available. Citation information follows below. Centers for Disease Control and Prevention. (2015, November). HIV Surveillance Report, 2014; vol.26. Retrieved from <http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/surveillance/index.html>.

2. Centers for Disease Control (2014). HIV Surveillance – Men Who Have Sex with Men (MSM) (through 2014). Retrieved from: <http://www.cdc.gov/hiv/library/slideSets/index.html>

3. Centers for Disease Control (2014). HIV Surveillance – Men Who Have Sex with Men (MSM) (through 2014). Retrieved from: <http://www.cdc.gov/hiv/library/slideSets/index.html>

4. Centers for Disease Control (2014). HIV Surveillance – Men Who Have Sex with Men (MSM) (through 2014). Retrieved from: <http://www.cdc.gov/hiv/library/slideSets/index.html>

5. Bauermeister, Jose A., Steven Meanley, Emily Pingel, Jorge Soler H., and Gary Harper W. "PrEP Awareness and Perceived Barriers among Single Young Men Who Have Sex with Men in the United States." Current HIV Research. U.S. National Library of Medicine, Oct. 2015. Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4152728>

6. Solorio, Rosa, Mark Forehand, and Jane Simoni. "Attitudes towards and Beliefs about HIV Testing among Latino Immigrant MSM: A Comparison of Testers and Nontesters." AIDS Research and Treatment. Hindawi Publishing Corporation, 23 Dec. 2013. Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3884801>