


EL VIH/SIDA ENTRE HISPANOS/LATINOS HETEROSEXUALES

WE'LL DEFEAT AIDS
CON GANAS

51,321 DIAGNÓSTICOS DE VIH DEL 2010 AL 2014 ENTRE HISPANOS/LATINOS



MUCHAS MUJERES HISPANAS/LATINAS DESCONOCEN LA HISTORIA SEXUAL DE SUS PAREJAS



MUJERES HETEROSEXUALES LATINAS TIENEN MAYOR RIESGO QUE LOS HOMBRES




DE LOS **1,490** CASOS DE VIH ENTRE MUJERES HISPANAS/LATINAS, 2014

5 DE CADA **6** se debió a contacto heterosexual


DE LOS **9,379** CASOS DE VIH ENTRE HOMBRE HISPANOS/LATINOS, 2014

3 DE CADA **37** se debió a contacto heterosexual

DE LOS DIAGNÓSTICOS DE VIH ADQUIRIDOS VIA CONTACTO HETEROSEXUAL EN EL 2014



PARA HISPANOS/LATINOS HETEROSEXUALES, EL VIH VARIA EN BASE A SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO



ITS INCREMENTA EL RIESGO DE INFECCIÓN DEL VIH



EL VIH/SIDA ENTRE HISPANOS/LATINOS HETEROSEXUALES



La información que ofrecemos aquí se relaciona a adultos y adolescentes Latinos/Hispanos cisgénero que reportan sentirse sexualmente atraídos a las personas del sexo opuesto. A menos de que algo diferente se declare, toda la información es inclusiva de los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes. Las mujeres tienen un mayor riesgo de exposición al VIH de una pareja masculina a través de las relaciones sexuales receptivas (sexo vaginal, anal) en comparación con los hombres que participan en las relaciones sexuales con penetración con parejas femeninas.

DATOS ¹

- Hubo un total de 222,185 diagnósticos de infección por VIH de 2010-2014 entre Hispanos/Latinos: el 18% de las infecciones fueron atribuidos al contacto heterosexual.
- El veintidós por ciento (744) de todas las infecciones por el VIH diagnosticadas en 2014 adquiridos a través del contacto heterosexual entre los hombres adultos y adolescentes se encontraban en los hombres Latinos/Hispanos en comparación con el 12% (422) de los hombres blancos no-Hispanos.
- El diecisiete por ciento (1,282) de todas las infecciones por el VIH diagnosticadas en 2014 adquiridas a través del contacto heterosexual entre los adultos y las adolescentes estaban en las mujeres Hispanas/Latinas comparado con el 15% (1115) a las mujeres blancas no-Hispanas.
- De las 9,379 infecciones por el VIH diagnosticadas en 2014 entre hombres adultos y adolescentes Hispanos/Latinos, 8% fueron atribuidos al contacto heterosexual. De las 1,490 infecciones por el VIH diagnosticadas en 2014 entre mujeres Hispanas/Latinas adultas y adolescentes, el 86% fueron atribuidos al contacto heterosexual.
- Entre Hispanos/Latinos en los Estados Unidos, la transmisión de VIH por contacto heterosexual varía de acuerdo al lugar de nacimiento y sexo. De los 1,282 casos de VIH diagnosticados en 2014 atribuidos al contacto heterosexual en mujeres Hispanas/Latinas, se estima que 403 fueron mujeres adultas y adolescentes nacidas en los Estados Unidos en comparación

con 140 mujeres nacidas en Centroamérica, 32 en Cuba, 146 en México, 200 en Puerto Rico y 36 en América del Sur. Entre los 744 casos entre los hombres Hispanos/Latinos adultos y adolescentes atribuidos al contacto heterosexual, se estima que 190 eran entre hombres nacidos en los Estados Unidos, en comparación con 82 nacidos en Centroamérica, 40 nacido en Cuba, 125 en México, 141 en Puerto Rico, y 26 en América del Sur.

FACTORES DE RIESGO:

Los Heterosexuales Hispanos/Latinos enfrentan diferentes obstáculos cuando se trata de prevenir el VIH y buscar tratamiento una vez que están infectados.

- Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) incrementan el riesgo de transmisión del VIH. Los resultados de investigación muestran que los índices reportados de ITS entre algunas minorías raciales o étnicas son más altos que entre los blancos. Razas y grupos étnicos en los Estados Unidos son poblaciones características que también tienen correlación con otros determinantes sociales importantes del estado de la salud.²
- Las mujeres Hispanas/Latinas podrían desconocer los factores que ponen en riesgo a sus parejas masculinas, o las evalúan de forma incorrecta.³
- País de origen y el número de años que viven en los Estados Unidos son factores importantes en la adquisición de información relevante sobre el uso del condón.⁴
- Parejas heterosexuales pueden subestimar su riesgo de contraer el VIH y renunciar a hacerse la prueba a consecuencia de las percepciones erróneas.

1. Note: Unless otherwise noted, all statistics represent data from the CDC's HIV Surveillance Report of the United States and its six dependent areas from the year 2014, the year in which the most recent data is available. Citation information follows below. Centers for Disease Control and Prevention. (2015, November). HIV Surveillance Report, 2014; vol. 26. <http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/surveillance/>. Accessed March 28, 2015

2. Centers for Disease Control and Prevention. (2013). STDs in Racial and Ethnic Minorities. <http://www.cdc.gov/std/stats13/minorities.htm>

3. Centers for Disease Control and Prevention. (2015). HIV/AIDS Surveillance by Race/Ethnicity-Slideset, 2011. http://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics_surveillance_women.pdf <http://www.cdc.gov/std/stats13/minorities.htm> slides: HIV surveillance by Race/Ethnicity: slides from CDC

4. Marin BV, Marin G. Acculturation differences in Hispanic condom use. *Int Conf AIDS*. 1990 Jun 20-23; 6: 105 (abstract no. S.C.37). UCSF Center for AIDS Prevention Studies, San Francisco, California, USA