



# EL VIH/SIDA ENTRE HISPANOS/LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS

WE'LL DEFEAT AIDS  
CON GANAS


**77,375** HISPANOS/LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS VIVÍAN CON VIH AL FINAL DEL 2013




HISPANOS/LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS SON EL **11%** DE LA POBLACION DE LOS EE.UU.



ELLOS REPRESENTAN EL **18%** DE LAS INFECCIONES DE VIH & **17%** DE CASOS DE SIDA EN EL 2014



DE LAS ESTIMADAS **264,210** PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON SIDA AL 2013



HISPANOS/LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS SUBESTIMAN SU RIESGO DE VIH DEBIDO A SU EDAD




MUCHOS HISPANOS/LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS NO PRIORIZAN SALUD SEXUAL


**MEDICACIÓN** debido a su falta de acceso a servicio médico económico y de calidad

- Artritis
- Demencia
- VIH

ESTIGMA HACIA HISPANOS/LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS VIH POSITIVOS PREVIENE QUE ELLOS DISCUTAN SEXUALIDAD CON OTROS.



HAY UNA FALTA DE SERVICIOS ENFOCADOS EN LAS NECESIDADES DE PERSONAS MAYORES LGBT, HSH, Y MUJERES HETEROSEXUALES QUE NO HABLAN INGLÉS



# EL VIH/SIDA ENTRE HISPANOS/LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS



## DATOS

- La mitad de las personas viviendo con VIH son mayores de 50 años. A medida de que la población de los Estados Unidos envejece y la mortalidad por VIH se reduce, se estima que un 65% de todas las personas viviendo con VIH serán mayores de 50 años dentro de los próximos años. En los Estados Unidos (EE.UU.) y sus seis áreas dependientes hubo un estimado de 7,541 casos diagnosticados de VIH en el 2014 entre adultos mayores de 50 años y se estima que hay 6,010 casos con diagnóstico de SIDA en nivel 3. Los Hispanos/Latinos de 50 años o más se encuentran sobre-representados entre los casos diagnosticados de VIH comparado con el tamaño de su población en relación a la población en general. A pesar de contar con aproximadamente 11% del total de la población de personas mayores de 50 años en los EE.UU. y Puerto Rico, los Hispanos/Latinos de este grupo representan un estimado del 18% (1,342) de los casos diagnosticados con VIH, y un estimado del 17% (1,016) entre los diagnósticos de SIDA a nivel 3.<sup>1,2</sup>
- De un estimado de 77,375 adultos Hispanos/Latinos mayores de 50 años vivían con VIH hacia finales del 2013 en los EE.UU. y sus 6 áreas dependientes: 19% del total de casos (404,552) comparado con 37% (151,076) individuos blancos no-Hispanos y 39% (158,815) individuos Afro-Americanos no-Hispanos. Del estimado de 264,210 personas de más de 50 años con diagnóstico de infección por VIH clasificada en algún momento como nivel 3 de SIDA hacia finales del 2013, 21% (54,634) fueron Hispanos/Latinos, 39% (103,146) fueron Negros Afro-Americanos no-Hispanos y 36% (94,194) fueron Blancos no-Hispanos.

## LECCIONES APRENDIDAS

- » 1 de cada 10 adultos mayores en los Estados Unidos es Hispano/Latino
- » 1 de cada 5 nuevas infecciones es Hispano/Latino
- » 1 de cada 5 adultos mayores viviendo con VIH es Hispano/Latino

## FACTORES DE RIESGO<sup>3</sup>

Los factores de riesgo para el VIH son complejos, se acentúan debido al proceso de envejecimiento y se acrecientan por los determinantes sociales de salud. Los siguientes factores de riesgo relacionados al envejecimiento podrían complicar la prevención del VIH, la transmisión y el tratamiento.

1. Cambios biológicos: El adelgazamiento de las paredes vaginales y la reducción en la lubricación pone a las mujeres a mayor riesgo de infección por VIH durante la penetración sexual.

2. Salud Mental: Altos niveles de depresión y síntomas de depresión se han encontrado en adultos mayores en comparación con aquellas personas menores de 50 años, así como en adultos mayores viviendo con VIH.
3. Reducción en la socialización/Incremento en el aislamiento ocurren frecuentemente a medida de que la persona envejece, y las amistades, familia y otras redes de apoyo se hacen menos accesibles, enferman o mueren.

Los determinantes sociales de salud como la pobreza, la localidad geográfica y el nivel de educación alcanzado podrían actuar como barreras para el acceso a cuidado de la salud completo y de calidad, permanecer en tratamiento, y/o adherencia al régimen para el cuidado de la salud, lo que incluye medicamentos. El conocimiento y la concientización son variables – los adultos mayores podrían no tener acceso o conocimiento expreso relacionado a la sexualidad, salud sexual y/o reproductiva que podrían reforzar los esfuerzos de prevención.

Factores a nivel individual como la evaluación del riesgo individual, también juegan un papel importante. Los adultos mayores podrían no considerarse a sí mismos en alto riesgo debido a su edad (ejemplo: “estoy muy viejo para infectarme.”) Otras enfermedades presentes también influyen el comportamiento y los resultados: Los adultos mayores Latinos, al igual que todos los adultos mayores, experimentan los efectos del proceso de envejecimiento y las enfermedades que resultan. Sin embargo, los Latinos sin seguro médico o sin acceso a cuidado médico de calidad a bajo costo podrían abandonar su cuidado sobre la salud sexual y reproductiva para dar prioridad a preocupaciones de salud más urgentes e inmediatas.

Factores a nivel comunitario como el estigma y la discriminación: Los adultos mayores experimentan barreras relacionadas a hablar sobre la sexualidad con los proveedores de servicios de salud, compañeros, familiares u otros miembros de sus comunidades, debido a vergüenza y al miedo. La discriminación basada en la edad se encuentra cuando miembros más jóvenes de la comunidad y grupos juzgan o tratan a las personas mayores o grupos de personas mayores con desprecio.

La falta de servicios culturalmente apropiados y servicios de calidad enfocados en las necesidades de las personas mayores, personas mayores LGBT, hombres mayores que tienen sexo con otros hombres y mujeres mayores que tienen sexo con hombres que no hablan inglés o que son bilingües, les ponen a riesgo.

1. US Census Bureau: Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Age, Race, and Hispanic Origin for the United States and States: April 1, 2010 to July 1, 2015. 2015 Population Estimates. <http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk> Accessed [August 30, 2016].

2. Centers for Disease Control and Prevention. HIV Surveillance Report, 2014; vol. 26. <http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/surveillance/>. Published November 2015. Accessed [August 30, 2016].

3. Centers for Disease Control: HIV Among People Aged 50 and Over. <http://www.cdc.gov/hiv/group/age/olderamericans/index.html> Accessed [August 30, 2016].