


# EL VIH/SIDA entre Hispanos/Latinos


## Mayores de 50 Años

**TO DEFEAT HIV**  
YOU'RE A SUPERHERO.  
USE YOUR SUPERPOWERS.


**84,874**  
HISPANOS/  
LATINOS MAYORES  
DE 50 AÑOS VIVÍAN  
CON VIH AL FINAL  
DEL 2014



LOS HISPANOS/LATINOS  
MAYORES DE 50 AÑOS SON  
EL **11%** DE LA POBLACIÓN  
DE LOS EE.UU.




ELLOS REPRESENTAN EL  
**18%** DE LAS INFECCIONES  
DE VIH & **16.5%** DE CASOS  
DE SIDA EN EL 2015




LOS HISPANOS/  
LATINOS MAYORES  
DE 50 AÑOS  
SUBESTIMAN SU  
RIESGO DE VIH  
DEBIDO A SU EDAD



DE LAS ESTIMADAS  
**437,671** PERSONAS  
MAYORES DE 50 AÑOS  
DIAGNOSTICADAS CON  
SIDA AL 2014



MUCHOS HISPANOS/  
LATINOS MAYORES DE  
50 AÑOS NO PRIORIZAN  
SALUD SEXUAL



debido a su  
falta de acceso a  
servicio médico  
económico y de  
calidad

EL ESTIGMA HACIA HISPANOS/  
LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS  
VIH POSITIVOS PREVIENE QUE  
ELLOS DISCUTAN SEXUALIDAD  
CON OTROS



HAY UNA FALTA DE SERVICIOS ENFOCADOS  
EN LAS NECESIDADES DE PERSONAS  
MAYORES LGBT, HSH, Y MUJERES  
HETEROSEXUALES QUE NO HABLAN INGLÉS



# EL VIH/SIDA ENTRE HISPANOS /LATINOS MAYORES DE 50 AÑOS



## DATOS

- Aproximadamente el 45% de las personas viviendo con VIH son mayores de 50 años [1]. Mientras que la población de los Estados Unidos envejece y la mortalidad por VIH se reduce, se estima que un 65% de todas las personas viviendo con VIH serán mayores de 50 años dentro de los próximos años.<sup>2</sup>
- En los Estados Unidos (EE.UU.) y sus seis áreas dependientes hubo un estimado de 6,891 casos diagnosticados de VIH en el 2015 en el grupo de adultos mayores de 50 años y se estima que hubo 5,320 nuevos casos con diagnóstico de SIDA en nivel 3.<sup>1</sup>
- Los Hispanos/Latinos de 50 años o más se encuentran sobre-representados entre los casos diagnosticados de VIH en ese grupo de edad comparado con la población en general. A pesar de representar solamente el 11% del total de la población de personas mayores de 50 años en los EE.UU. y Puerto Rico, los Hispanos/Latinos de este grupo representan un 19% (1,281) de los casos diagnosticados con VIH, y un 16% (878) de los diagnósticos de SIDA a nivel 3.<sup>1</sup>
- Se estima que 841,874 adultos Hispanos/Latinos mayores de 50 años vivían con VIH hacia finales del 2014 en los EE.UU. y sus 6 áreas dependientes, representando un 19% del total de casos (437,671) comparado con un 37% en individuos blancos no-Hispanos y 39% en individuos Afroamericanos no-Hispanos.<sup>1</sup>
- Del total de 283,687 personas mayores de 50 años con diagnóstico de infección por VIH clasificada en algún momento como nivel 3 de SIDA hacia finales del 2014, 21% (59,465) fueron Hispanos/Latinos, 39% (109,729) fueron Negros Afroamericanos no-Hispanos y 35% (100,659) fueron Blancos no-Hispanos.<sup>1</sup>

## LECCIONES APRENDIDAS

- » 1 de cada 10 adultos mayores en los Estados Unidos es Hispano/Latino<sup>2</sup>
- » 1 de cada 5 nuevas infecciones suceden en Hispano/Latino<sup>1</sup>
- » 1 de cada 5 adultos mayores viviendo con VIH es Hispano/Latino<sup>1</sup>

## FACTORES DE RIESGO

- Los factores de riesgo para el VIH son complejos, se acentúan debido al proceso de envejecimiento y se acrecientan por los determinantes sociales de salud. Los siguientes factores de riesgo relacionados al envejecimiento podrían complicar la prevención del VIH, su transmisión y su tratamiento.

1. Cambios biológicos: El adelgazamiento de las paredes

vaginales y la reducción en la lubricación pone a las mujeres a mayor riesgo de infección por VIH durante la penetración sexual.

2. Salud Mental: Altos niveles de depresión y síntomas de depresión se han encontrado en adultos mayores en comparación con aquellas personas menores de 50 años, así como en adultos mayores viviendo con VIH.
3. Reducción en la socialización/Incremento en el aislamiento ocurren frecuentemente a medida de que la persona envejece, y las amistades, familia y otras redes de apoyo se hacen menos accesibles, enferman o mueren.<sup>3</sup>

- Los determinantes sociales de salud como la pobreza, la localización geográfica y el nivel de educación alcanzado podrían actuar como barreras para el acceso a un completo cuidado de la salud y de calidad, permanencia en tratamiento, y/o adherencia al régimen para el cuidado de la salud, incluyendo adherencia a medicamentos. El conocimiento y la concientización son variables – los adultos mayores podrían no tener acceso o conocimiento expreso relacionado a la sexualidad, salud sexual y/o reproductiva que podrían reforzar los esfuerzos de prevención.<sup>3</sup>
- Factores a nivel individual como la evaluación del riesgo individual, también juegan un papel importante. Los adultos mayores podrían no considerarse a sí mismos en alto riesgo debido a su edad (ejemplo: “estoy muy viejo para infectarme.”) Otras enfermedades presentes también influyen el comportamiento y los resultados: Los adultos mayores Latinos, al igual que todos los adultos mayores, experimentan los efectos del proceso de envejecimiento y las enfermedades que resultan. Sin embargo, los Latinos sin seguro médico o sin acceso a cuidado médico de calidad a bajo costo podrían abandonar su cuidado de salud sexual y reproductiva para dar prioridad a preocupaciones de salud más urgentes e inmediatas.<sup>3</sup>
- Factores a nivel comunitario como el estigma y la discriminación: Los adultos mayores experimentan barreras relacionadas a hablar sobre la sexualidad con los proveedores de servicios de salud, compañeros, familiares u otros miembros de sus comunidades, debido a vergüenza y al miedo. La discriminación basada en la edad sucede cuando miembros más jóvenes de la comunidad y grupos juzgan o tratan a las personas mayores o grupos de personas mayores con desprecio. La falta de servicios culturalmente apropiados y servicios de calidad enfocados en las necesidades de las personas mayores, personas mayores LGBT, hombres mayores que tienen sexo con otros hombres y mujeres mayores que tienen sexo con hombres que no hablan inglés o que son bilingües, los ponen a riesgo.<sup>3</sup>

1. Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from <https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf>

2. Census Bureau: Annual estimates of the resident population by sex, age, race and Hispanic origin

in the United States: April 1, 2010 to July 1, 2015. (2015). Retrieved from: <http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk>

3. Center for Disease Control: HIV among people aged 50 and over (2016). Retrieved from: <https://www.cdc.gov/hiv/group/age/olderamericans/index.html>